

Cómo aplicar el nitrato de plata

Se puede usar el nitrato de plata para tratar el tejido de granulación en la sonda de gastrostomía, yeyunostomía, sonda gastroyeyunal y en sitios de traqueotomía.

¿Qué es el nitrato de plata?

Es un medicamento que viene en un palillo de madera.

¿Por qué se usa el nitrato de plata?

Se usa para encoger o deshacerse del tejido adicional de piel que se llama tejido de granulación. Se puede usar en el tejido de granulación alrededor de las sondas de alimentación en la panza y de las sondas de traqueotomía.

¿Qué es el tejido de granulación?

Es tejido adicional que crece en heridas que están sanando.

¿Cómo uso el nitrato de plata?

Sólo use el medicamento después de hablar con el médico o enfermera de su hijo. No lo aplique si no le enseñaron cómo usarlo. No lo aplique alrededor de sondas de traqueotomía si el tejido de granulación se encuentra completamente alrededor del estoma de traqueotomía.

Siga estos pasos para aplicar el medicamento. Pídale a alguien que lo ayude a sostener a su hijo para que no se mueva mucho.

Sondas de alimentación		Sondas de traqueotomía	
1. Reúna los materiales - Guantes - Gasa - Nitrato de plata - Vaselina o crema protectora		1. Reúna los materiales - Guantes - Gasa o Mepilex - Nitrato de plata	
2. Lávese las manos.		2. Lávese las manos.	
3. Póngase los guantes para proteger sus manos.		3. Póngase los guantes para proteger sus manos.	
4. Use su dedo para untar la Vaselina o la crema protectora en la piel alrededor del tejido de granulación. No ponga Vaselina en los sitios de traqueotomía. Esto puede ser dañino.		4. Use una gasa para secar cualquier humedad que haya en el estoma antes de usar el nitrato de plata. No ponga Vaselina en los sitios de traqueotomía. Esto puede ser dañino.	
5. Tome un palillo y aplíquelo suavemente con toquitos o ruédelo en el tejido de granulación. Se va a poner gris o blanco cuando lo trate. El medicamento en el palillo cambiará de color de café a blanco.		5. Tome un palillo y aplíquelo suavemente con toquitos o ruédelo en el tejido de granulación. Se va a poner gris o blanco cuando lo trate. El medicamento en el palillo cambiará de color de café a blanco. Esto es normal.	

Esto es normal. Siga aplicando el medicamento en el tejido de granulación hasta que lo haya tratado completamente.	Siga aplicando el medicamento en el tejido de granulación hasta que lo haya tratado completamente.
6. Seque la piel con la gasa cada dos veces que unte el medicamento. Esto ayuda a que se absorba el medicamento adicional en lugar de que se quede en la piel.	6. Seque la piel con la gasa cada dos veces que unte el medicamento. Esto ayuda a que se absorba el medicamento adicional en lugar de que se quede en la piel.
7. Después de tratar el tejido de granulación, coloque una gasa con ranura en la piel durante 1 hora. Esto ayudará a que se absorba cualquier supuración.	7. Después de tratar el tejido de granulación, deje el área al aire durante al menos 4 a 5 horas.
8. Ponga el palillo que usó en una bolsa de plástico y ciérrela. Tira la bolsa en la basura.	8. Ponga el palillo que usó en una bolsa de plástico y ciérrela. Tira la bolsa en la basura.
10. Retire o cambie la gasa con ranura después de 1 hora.	10. Si su hijo tiene un vendaje en la traqueotomía, lo puede colocar después de 4 a 5 horas.

¿Qué sucede con el tejido después de usar el medicamento?

El tejido de granulación que se trate se secará y caerá. Esto puede tomar de 1 a 2 días.

¿Cómo sé si debo usar más medicamento en el tejido?

Siga las indicaciones del médico o enfermera de su hijo. Espere 24 horas antes de usar el medicamento otra vez. No lo use durante más de 5 días seguidos.

¿Cómo almaceno el nitrato de plata?

Mantenga los palillos con el medicamento en el empaque y almacénelo en un lugar seguro. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas. Tire cualquier medicamento que haya expirado en una bolsa de plástico cerrada. No lo tire en el inodoro.

¿Qué hago con el medicamento después de que desaparezca el tejido de granulación de mi hijo?

Puede quedarse con el medicamento si está en un lugar seguro y no ha vencido. La enfermera o el médico de su hijo podrían indicarle que vuelva a usar el medicamento otra vez.

Información especial

Es posible que el sitio esté adolorido después de aplicar este medicamento. El medicamento puede causar algo de picazón, lo cual desaparece después de unos cuantos minutos.

Algunas veces, el nitrato de plata puede causar una lesión leve en la piel. Esto es raro. Puede quemarse y estar roja la piel pero sanará. No permita que el medicamento toque otras partes en la piel ni superficies.

Deje de usar el medicamento si la piel alrededor de la sonda está manchada, abierta, tiene ampollas o se está pelando. El color oscuro desaparecerá, pero puede tomar hasta una semana.

Revise el tamaño del tejido de granulación todos los días cuando realice los cuidados del área.

Otras hojas de enseñanza que pueden ser de ayuda

- [3005](#) Tejido de granulación en la sonda de alimentación.

ALERTA: Llame a la enfermera de su hijo si usted o su hijo tienen alguna inquietud o si:

- El tejido de granulación no disminuye de tamaño.
- El tejido de granulación no desaparece en 5 días.
- La piel alrededor de la sonda está abierta, tiene ampollas o se está pelando.
- Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.